Раздел № 01. Введение в математический анализ

Тема № 02. вещественные числа

Лекция № 03. вещественные числа. Аксиома полноты

Учебные вопросы:

1. Общие свойства множества вещественных чисел
2. Промежутки
3. Абсолютная величина (модуль) вещественного числа
4. Геометрическая интерпретация

Литература

1. Аксенов А. П. Математика. Математический анализ Ч. 1 : учеб. пособие
А. П. Аксенов — СПб.: Изд-во Политехн, ун-та, 2009. — 614 с.
(Математика в политехническом университете). ISBN 978-5-7422-2305-4
2. Зорич В. А. Математический анализ: Учеб. для мат. и физ.-мат. фак. и спец. вузов/ В. А. Зорич.- 4-е изд., испр.-Москва: МЦНМО, 2002 Ч.1.- 2002.- 657 с. : ил.- Библиогр.: с.641-644. ISBN 5940570569
3. Тер-Крикоров А. М. Шабунин М. И. Курс математического анализа: учебное пособие для вузов по направлению "Прикладная математика и физика" / А. М. Тер-Крикоров, М. И. Шабунин. -7-е изд. -Москва: Лаборатория знаний: [Лаборатория Пилот, 2017]. -672 с. : ил.; 22 см. - (Математика).-Библиогр.: с. 664. -Предм. указ.: с. 665-669.ISBN 978-5-00101-039-5.

1. Общие свойства множества вещественных чисел

Будем исходить из представлений и опыта работы с числами, которые у нас сложились в школе.

Множество вещественных чисел обозначим через $\mathbb{R}$. Сейчас мы перечислим основные свойства — аксиомы множества вещественных чисел. Большая их часть нам хорошо знакома. Исключение составит свойство полноты, которое следует рассмотреть с особым вниманием.

I. На множестве вещественных чисел определена операция сложения. К основным свойствам сложения отнесем:

- 1) Коммутативность.
- 2) Ассоциативность.
- 3) Существование нейтрального элемента (0).
- 4) Существование противоположного элемента.

II. На множестве вещественных чисел определена операция умножения. К основным свойствам сложения отнесем:

- 1) Коммутативность.
- 2) Ассоциативность.
- 3) Существование нейтрального элемента ($1 \neq 0$).
- 4) Существование обратного элемента.

III. Сложение и умножение связаны законом дистрибутивности:

$$(x + y)z = xz + yz. \quad (1)$$

IV. На множестве вещественных чисел определено отношение порядка $\leq$.

Порядком называется отношение с тремя свойствами:

$$\begin{aligned}x &\leq x, \\x &\leq y \wedge y \leq x \Rightarrow x = y, \\x &\leq y \wedge y \leq z \Rightarrow x \leq z.\end{aligned}\tag{2}$$

Отношение порядка на $\mathbb{R}$ является *линейным порядком*:

$$\forall x, y \in \mathbb{R} \quad x \leq y \vee y \leq x.\tag{3}$$

V. Связь арифметических операций и порядка

$$\begin{aligned}x &\leq y \Rightarrow x + z \leq y + z \\x, y &\geq 0 \Rightarrow xy \geq 0\end{aligned}\tag{4}$$

VI. Аксиома полноты

Пусть X, Y — непустые множества вещественных чисел, причем

$$\forall x \in X \quad \forall y \in Y \quad x \leq y.\tag{5}$$

Тогда $\exists c \in \mathbb{R} \quad \forall x \in X \quad \forall y \in Y \quad x \leq c \leq y$ (6)

Определение. X — непустое множество вещественных чисел.

Число M называется *верхней границей* множества X , если

$$\forall x \in X \quad x \leq M.\tag{6}$$

Число m называется *нижней границей* множества X , если

$$\forall x \in X \quad x \geq m.\tag{8}$$

Множество, имеющее верхнюю границу, называется *ограниченным сверху*.

Множество, имеющее нижнюю границу, называется *ограниченным снизу*.

Множество, ограниченное сверху и снизу, называется *ограниченным*.

Теорема 1. Существование точных граней

1) Пусть множество E ограничено сверху. Тогда среди верхних границ множества E существует наименьшая.

2) Пусть множество E ограничено снизу. Тогда среди нижних границ множества E существует наибольшая.

► Пусть $E^s \neq \emptyset$ — множество верхних границ множества E . Ясно, что

$$\forall x \in E \forall y \in E^s \quad x \leq y.$$

По аксиоме полноты

$$\exists M \in \mathbb{R} \quad \forall x \in E \forall y \in E^s \quad x \leq M \leq y.$$

Неравенство $x \leq M$ означает, что M — верхняя граница множества E , а неравенство $M \leq y$ означает, что E — наименьшая верхняя граница. ◀

Определение. 1) Пусть E — ограниченное сверху множество вещественных чисел. Наименьшая верхняя граница множества E называется *точной верхней границей, точной верхней гранью* и обозначается

$$\sup E = \sup_{x \in E} x. \quad (9)$$

2) Пусть E — ограниченное снизу множество вещественных чисел. Наибольшая нижняя граница множества E называется *точной нижней границей, точной нижней гранью* и обозначается

$$\inf E = \inf_{x \in E} x. \quad (10)$$

Теорема 2. Описание точных граней на ε -языке.

$$1) M = \sup E \Leftrightarrow \begin{array}{l} \forall x \in E \quad x \leq M \\ \forall \varepsilon > 0 \exists x \in E \quad x > M - \varepsilon \end{array}. \quad (11)$$

$$2) m = \inf E \Leftrightarrow \begin{array}{l} \forall x \in E \quad x \geq m \\ \forall \varepsilon > 0 \exists x \in E \quad x < m + \varepsilon \end{array}. \quad (12)$$

Предложение.

1) Если $A \subset B$, B ограничено сверху, то A ограничено сверху и

$$\sup A \leq \sup B.$$

2) $\sup(A + x) = \sup A + x$ (здесь $A + x = \{y + x \mid y \in A\}$).

3) Если $\lambda > 0$, то $\sup \lambda A = \lambda \sup A$; $\sup(-A) = -\inf A$ (здесь $\lambda A = \{\lambda x | x \in A\}$).

Пример. $\sup(0, 1) = 1$

Если $z = \sup E \in E$, то $z = \max E$ — наибольший элемент множества E .

Если $z = \max E$, то $z = \sup E$.

2. Промежутки

К промежуткам относят множества вещественных чисел следующих типов:

$[a, b] = \{x | a \leq x \leq b\}$ — отрезок (здесь $a \leq b$),

$(a, b) = \{x | a < x < b\}$ — интервал (здесь $a < b$),

$[a, b) = \{x | a \leq x < b\}$ (здесь $a < b$),

$(a, b] = \{x | a < x \leq b\}$ (здесь $a < b$),

$[a, +\infty) = \{x | x \geq a\}$ — замкнутый луч,

$(a, +\infty) = \{x | x > a\}$ открытый луч,

$(-\infty, b] = \{x | x \leq b\}$ — замкнутый луч,

$(-\infty, b) = \{x | x < b\}$ открытый луч,

$(-\infty, +\infty) = \mathbb{R}$.

Промежуток Δ характеризуется тем свойством, что

$$\forall x, y \in \Delta \quad x < z < y \Rightarrow z \in \Delta.$$

3. Абсолютная величина (модуль) вещественного числа

1⁰. Определение.

$$|x| = \begin{cases} x, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases} \quad (1)$$

2⁰ Основные свойства:

- 1) $|x| = \max\{x, -x\}$,
- 2) $|x| \geq 0$, $|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$,
- 3) $|-x| = |x|$,
- 4) $|xy| = |x||y|$,
- 5) $-|x| \leq x \leq |x|$,
- 6) $a > 0 \quad |x| \leq a \Leftrightarrow -a \leq x \leq a$,
- 7) $|x + y| \leq |x| + |y|$,
- 8) $|x \pm y| \geq ||x| - |y||$

Предложение. Множество $E \subset \mathbb{R}$ ограничено в том и только в том случае, если

$$\exists M \forall x \in E |x| \leq M. \quad (2)$$

4. Геометрическая интерпретация

Рассмотрим прямую l , выберем на ней точку O , которую будем называть *началом отсчета* и считать изображением числа 0, точку E для изображения числа 1. Направление от O к E назовем положительным и отметим стрелкой (рис. 1). Отрезок

Рис. 1

OE — масштабный отрезок, его длина считается равной единице. Каждому положительному числу x ставим в соответствие точку M , находящуюся на луче OE на расстоянии x от начала отсчета O . Отрицательному числу $(-x)$ ставим в соответствие точку M' , симметричную точке M относительно начала отсчета O . Тем самым установлено взаимно однозначное соответствие между множеством $\mathbb{R}$ вещественных чисел и точками прямой l . Прямую l будем называть *числовой прямой* или *числовой осью*. В дальнейшем мы часто будем отождествлять числа и изображающие их точки, называть вещественные числа точками.

Разработал доцент кафедры высшей математики Моисеев А. А.